

Определением патологической стираемости зубов является деградация твердых зубных тканей в нескольких или одном из зубов. К сожалению, такое заболевание встречается более чем у 110 части населения планеты Земля, преимущественно у мужчин.

Каковы причины этой проблемы? В первую очередь, повышенная стираемость может появиться после того, как человек утратил один или несколько зубов. В таком случае происходит перераспределение жевательной нагрузки на другие зубы, из-за чего другие зубы могут подвергаться более быстрому разрушению.

Вторая причина,

это неверная конструкция установленных протезов для зубов. Эта причина в чем-то сходна с первой, только уже по вине низкой квалификации стоматолога, который занимался подбором и установкой зубных протезов для человека.

Третья причина,

по частоте явления, это природные аномалии зубов. Ведь все мы разные и в нашей генетике также закладывается развитие зубных тканей. Из-за вредных воздействий окружающей среды, генетика передает не только самые лучшие признаки нашим детям, но могут быть и какие-то аномальности.

Четвертая причина

– профессиональные вредные воздействия, связанные с нагрузкой на зубные ткани, плохие привычки. Какая работа может быть вредной для повышенной стираемости? Это работа с абразивами, работа с повышенным содержанием в воздухе твердых частиц (которые попадают на зубную поверхность и при механическом жевании способствуют ускоренному разрушению). Также это может быть работа с агрессивными щелочами и кислотами (как органическими, так и неорганическими) – в таком случае одновременно разрушаются ткани всех зубов.

Пятая причина

– это низкая твердость тканей зубов из-за системных заболеваний. Например это возникает из таких болезней как гипоплазия или флюороз, а также при эндокринных проблемах (которые сегодня встречаются достаточно часто).

К чему это все приводит? Повреждаются от истирания жевательные поверхности боковых зубов, а также передние зубы (их режущие края). В течении жизни, к средним годам, человек может утрачивать до половины зуба из-за истирания. Особенно это может быть заметно на клыках и резцах.

Обращайтесь в нашу клинику – мы поможем поставить квалифицированный диагноз и эффективно решать Вашу проблему, связанную с патологической стираемостью зубных тканей.

Усик Оксана Сергеевна
(стоматолог-терапевт; пародонтолог; гигиенист)